

Predicciones de las condiciones de propagación HF ALONSO MOSTAZO PLANO. EA3EPH.

Condiciones generales de propagación HF para octubre-noviembre 2015.

El día 1 de octubre a las 12 UTC el Sol se encuentra a $-3^{\circ} 19'$ latitud Sur, alcanzando una elevación de 46° al mediodía sobre Madrid.

Según las previsiones de la "NOAA" el flujo solar medio en 2800MHz para éste mes al realizar los cálculos es 110.6 y como otras veces, se darán días con valores diferentes, estimando las siguientes condiciones de propagación HF dentro de un comportamiento global de la ionosferas y al margen de las variaciones no periódicas de ésta:

POR BANDAS:

Banda de 10 11 y 13m

Ambos Hemisferios: Durante el día, las condiciones de propagación serán mayormente malas y, aunque en el hemisferio sur estarán ayudadas por presencia de ionizaciones esporádicas, predominarán largos cierres durante el día.

Durante la noche cerrada.

Banda de 15 y 16m

Ambos Hemisferios Las condiciones serán regulares, dándose distancias de salto comprendidas entre los 1200 Km y 2800 Km durante el día, así como con cierres esporádicos en éste.

Las máximas condiciones para el DX, en horas cercanas al orto/ocaso hacia la zona en que es dedía.

Durante la noche cerrada salvo poco después de anochecer, un poco más tarde en el hemisferio sur y latitudes bajas de ambos hemisferios.

Banda de 19 y 20m

Hemisferio Norte: Las condiciones serán regulares, con posible empeoramiento alrededor del mediodía así como cierres esporádicos, dándose unas distancias de saltos comprendidas entre los 1100 Km y 2500 Km a lo largo del día.

Las máximas condiciones para el DX en horas cercanas al orto/ocaso y extendiéndose en latitudes bajas hasta entrada la noche.

Hemisferio Sur: Las condiciones de propagación regulares durante el día,

con unas distancias de salto comprendida entre los 1100 Km y 2700 Km aproximadamente, con empeoramiento en horas cercanas al mediodía y como en el hemisferio norte, podrán darse cierres a cualquier hora.

Las máximas condiciones para el DX en horas cercanas al orto/ocaso y posiblemente se mantengan a lo largo de la noche.

En ambos hemisferios: Propagación entre ambos hemisferios desde poco antes y hasta poco después del anochecer.

Banda de 25m

Hemisferio Norte: Durante el día las condiciones de propagación parecidas a las dadas en las anteriores bandas, regulares, con empeoramiento más pronunciado en horas cercanas al mediodía y manteniéndose saltos comprendidos entre los 900 Km y 1500 Km.

Durante la noche, serán buenas y con empeoramiento conforme nos acercamos al amanecer, dándose distancias de salto hasta cercanas a los 3000 km.

Hemisferio Sur: Las condiciones de propagación serán regulares durante el día, con empeoramiento en horas cercanas al mediodía y máximas condiciones para el DX hacia la zona en que es de noche en horas cercanas al orto y ocaso.

En la noche, mejores condiciones en general, parecidas a las dadas en el hemisferio norte.

Banda de 31m

Hemisferio Norte: Durante el día las condiciones de propagación serán regulares, con empeoramiento alrededor del mediodía.

Durante la noche se darán buenas condiciones en general, máximas para el DX poco después del anochecer, así como antes del amanecer.

Hemisferio Sur: Durante el día las condiciones serán parecidas a las dadas en el hemisferio norte.

Al anochecer, mejorarán, alcanzándose las máximas para el DX en horas cercanas a la media noche.

Banda de 40m

Hemisferio Norte: Durante el día las condiciones serán regulares e incluso con tendencia a malas en horas cercanas al mediodía, dándose distancias de salto comprendidas entre los 500 Km y 1200 Km, crecientes conforme la elevación del Sol es menor.

Poco antes del anochecer las condiciones mejorarán, se alcanzarán las máximas para el DX en horas cercanas a la medianoche y manteniéndose a

lo largo de ésta saltos comprendidos entre los 1200 Km/2300 Km.

Hemisferio Sur: Durante el día se darán unas condiciones muy parecidas a las del hemisferio norte, aunque con distancias de salto inferiores y emporamiento pronunciado en horas cercanas al mediodía.

Durante toda la noche esas condiciones serán regulares en general, alcanzándose las máximas para el DX en horas cercanas a la media noche y empeorarán fuertemente poco antes del amanecer.

Banda de 49m

Hemisferio Norte: Durante el día esas condiciones serán regulares, con empeoramiento en horas cercanas al mediodía y con unas distancias de salto saltos comprendidas entre los 300 Km/600 Km.

Poco después del anochecer, mejorarán, alcanzándose las máximas e incluso para el DX alrededor de la medianoche.

Hemisferio Sur: Durante el día condiciones parecidas a las dadas en el hemisferio norte, aunque un empeoramiento más pronunciado alrededor del mediodía.

Durante la noche serán peores que las dadaa en el norte, máximas alrededor de la media noche.

Banda de 80 y 160m

Ambos Hemisferios: Debido a una fuerte absorción difícilmente se darán comunicados en éstas bandas durante el día, salvo poco en horas cercanas al orto/ocaso.

Al entrar la noche, poco a poco mejorarán conforme avanza ésta, se alcanzarán las máximas alrededor de la media noche y posiblemente es extiendan después de ésta, aunque serán peores en el sur.

En todas las bandas:

Saltos inferiores a los mínimos mencionados por presencia ionizaciones esporádicas “mayormente en el hemisferio sur” y mayores distancias a los 3000 Km por saltos múltiples.

CONCEPTOS:

1/-MAXIMA FRECUENCIA UTILIZABLE "MFU":

La máxima frecuencia utilizable "MFU" es básicamente la frecuencia más alta que permite la comunicación entre dos puntos mediante refracción ionosférica, el valor de ésta y al margen de los sistemas empleados depende principalmente del nivel de densidad electrónica y en consecuencia del valor

de la frecuencia crítica dado en la ionosfera así como del ángulo de radiación de la onda o bien del ángulo de incidencia al alcanzar la ionosfera.

2/-FRECUENCIA OPTIMA DE TRABAJO "FOT":

La frecuencia óptima de trabajo "FOT", se considera que es la frecuencia más estable y segura que permite la comunicación entre dos puntos por refracción ionosférica.

El valor de ésta es un 85% de la máxima frecuencia utilizable, dependiendo principalmente de la elevación del Sol, actividad Solar y actividad magnética, sin tener en cuenta las condiciones de emisión y recepción.

Estudio de circuitos HF centrado en Africa
Periodo de aplicación: Octubre Noviembre 2015
(Programa de Sondeo de EA3EPH)
Flujo solar estimado (según NOAA):110.6
FOT y MFU expresado en MHz

DISTANCIA:

300 km:

UTC	FOT	MFU
00	5.5	6.5
02	6.1	7.2
04	8.6	10.1
06	9.6	11.3
08	10.6	12.4
10	11.1	13.1
12	10.6	12.4
14	9.6	11.3
16	8.6	10.1
18	6.1	7.2
20	5.5	6.5
22	4.7	5.5

600 Km:

UTC	FOT	MFU
00	6.0	7.1
02	6.7	7.9
04	9.4	11.1

06	10.6	12.5
08	11.6	13.7
10	12.2	14.4
12	11.6	13.7
14	10.6	12.5
16	9.4	11.1
18	6.7	7.9
20	6.0	7.1
22	5.1	6.0

1200 Km

UTC	FOT	MFU
00	7.2	8.5
02	8.1	9.5
04	11.3	13.3
06	12.7	14.9
08	13.9	16.4
10	14.7	17.3
12	13.9	16.4
14	12.7	14.9
16	11.3	13.3
18	8.1	9.5
20	7.2	8.5
22	6.2	7.2

1800 Km:

UTC	FOT	MFU
00	8.8	10.3
02	9.8	11.5
04	13.7	16.1
06	15.4	18.1
08	16.9	19.8
10	17.8	20.9
12	16.9	19.8
14	15.4	18.1
16	13.7	16.1
18	9.8	11.5
20	8.8	10.3
22	7.4	8.8

3000 Km:

UTC	FOT	MFU
00	13.9	16.4
02	15.6	18.3
04	21.8	25.6
06	24.5	28.8
08	26.8	31.5
10	28.2	33.2
12	26.8	31.5
14	24.5	28.8
16	21.8	25.6
18	15.6	18.3
20	13.9	16.0
22	11.8	13.9

Europa:

UTC	FOT	MFU
00	9.7	11.4
02	10.4	12.2
04	21.5	25.3
06	23.6	27.8
08	25.2	29.7
10	25.9	30.5
12	25.2	29.7
14	23.6	27.8
16	21.5	25.3
18	10.4	12.2
20	9.7	11.4
22	9.4	11.0

Saludos.

alonso, ea3eph.